

Povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, hradené zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2025, ktoré je súčasťou Národného imunizačného programu

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

ROČNÍK NARODENIA	VEK	POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE HRADENÉ ZP	
		DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA
2025	v 3. mesiaci života (od prvého dňa 10. týždňa života*)	záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulárna vakcína), vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové nákazy, detská obrna (DTaP-VHB-Hib-IPV) pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou)**	I. dávka (základné očkovanie)
	v 5. mesiaci života		II. dávka (základné očkovanie)
	v 11. mesiaci života		III. dávka (základné očkovanie)
2024	najskôr prvý deň 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci života	osýpky, mumps, ružienka (MMR)	I. dávka
2021	v 5. roku života	osýpky, mumps, ružienka (MMR)	II. dávka
2020	v 6. roku života	záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna (DTaP-IPV)	preočkovanie
2015	v 11. roku života	osýpky, mumps, ružienka (MMR)	II. dávka
2013	v 13. roku života	záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna (dTAP-IPV)	preočkovanie
X	Dospelí vo veku 30 rokov***	záškrt, tetanus (dT)	preočkovanie každých 15 rokov

Poznámky:

* Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa sa prvá dávka hexavalentnej podáva už od prvého dňa desiateho týždňa života.

** Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojíť proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 15-valentná konjugovaná vakcína, 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína- Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

*** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

V prípade, ak sa nevykoná očkovanie podľa schémy uvedenej v očkovacom kalendári, postupuje sa v súlade s Prílohou č. 2a vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky

**Očkovanie hradené zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2025,
ktoré je súčasťou Národného imunizačného programu**

ROČNÍK NARODENIA	VEK	POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE HRADENÉ ZP		ODPORUČANÉ OČKOVANIE HRADENÉ ZP		DOOČKOVANIE ("CATCH-UP") HRADENÉ ZP	
		DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA	DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA	DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA
2025	v 3. mesiaci života (od prvého dňa 10. týždňa života) ¹	záškrť, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové nákazy detská obrna (DTaP-VHB-Hib-IPV)	I. dávka (základné očkovanie)				
	v 5. mesiaci života		II. dávka (základné očkovanie)				
	v 11. mesiaci života		III. dávka (základné očkovanie)				
	vo veku 6 - 24 týždňov (Rotarix) vo veku 6 - 32 týždňov (Rotateq)	rotavirusové infekcie	2 až 3 dávky podľa zvolenej vakcíny ³				
2024	najskôr prvý deň 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci života	osýpky, mumps, ružienka (MMR)	I. dávka				
2024	v 3. roku života ⁴			vírusová hepatitída A (VHA)	I. dávka II. dávka		
2021	v 5. roku života	osýpky, mumps, ružienka (MMR)	II. dávka				
2020	v 6. roku života	záškrť, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna (DTaP-IPV)	preočkovanie				
2015	v 11. roku života	osýpky, mumps, ružienka (MMR)	II. dávka				
2013	v 13. roku života	záškrť, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna (DTaP-IPV)	preočkovanie				
2013	v 13. roku života ⁵			infekcie spôsobené humánnymi papilomavírusmi (HPV)	I. dávka II. dávka		
2012	v 14. roku života ⁶					infekcie spôsobené humánnymi papilomavírusmi (HPV)	I. dávka II. dávka
2011	v 15. roku života ⁶					infekcie spôsobené humánnymi papilomavírusmi (HPV)	I. dávka II. dávka
X	Dospelí vo veku 30 rokov ⁷	záškrť, tetanus (dT)	preočkovanie každých 15 rokov			záškrť, tetanus (dT)	I. dávka

Poznámky:

¹ Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa sa prvá dávka hexavalentnej podáva už od prvého dňa desiateho týždňa života.

² Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom **prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života** vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 15-valentná konjugovaná vakcína, 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

³ Pri použití vakcíny:

- **Rotarix:** Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov. Vakcinačné schéma sa má prednostne podať pred dosiahnutím veku 16 týždňov, ale musí sa ukončiť do veku 24 týždňov. Medzi dávkami má byť časový odstup najmenej 4 týždne.

- **Rotateq:** Očkovacia schéma pozostáva z 3 dávok. Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov, a nie neskôr ako vo veku 12 týždňov. Troj-dávková očkovacia schéma sa uprednostňuje ukončiť do veku 20 až 22 týždňov. Ak je to nevyhnutné, môže sa tretia (posledná) dávka podať do veku 32 týždňov. Medzi dávkami majú byť minimálne 4-týždňové intervaly.

⁴ Odporúčané očkovanie proti VHA - v súlade s § 9 ods.4 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 585/5007 Z.z. sa očkujú deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania. deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.

⁵ Odporúčané očkovanie hradené ZP proti infekciám, ktoré sú spôsobené humánnymi papilomavírusmi, sa aplikuje v 13. roku života (12-ročným dievčatám a chlapcom).

⁶ Catch-up očkovanie proti infekciám, ktoré sú spôsobené humánnymi papilomavírusmi, sa môže aplikovať adolescentom v 14. a 15. roku veku (13-ročným a 14-ročným adolescentom), pokiaľ boli prekážkou očkovania v 13. roku veku dočasná kontraindikácia.

⁷ Preočkovanie dospelých proti záškrťu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrťu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrťu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrťu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

V prípade, ak sa nevykoná očkovanie podľa schémy uvedenej v očkovacom kalendári, postupuje sa v súlade s Prílohou č. 2a vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.

Odporúčané očkovanie detí, hradené zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2025, ktoré je súčasťou Národného imunizačného programu

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

ROČNÍK NARODENIA	VEK	ODPORÚČANÉ OČKOVANIE HRADENÉ ZP	
		DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA
2025	<i>vo veku 6 - 24 týždňov (Rotarix) vo veku 6 - 32 týždňov (Rotateq)</i>	<i>rotavírusové infekcie</i>	2 až 3 dávky podľa zvolenej vakcíny*
2024	<i>v 3. roku života**</i>	vírusová hepatitída A	I. dávka
			II. dávka
X	<i>od šiestich mesiacov do 12 rokov</i>	chripka	jedna dávka každoročne
			u detí do 9 rokov, ktoré neboli v minulosti očkované, sa podáva aj II. dávka mesiac po prvej dávke
2013	<i>v 13. roku života***</i>	infekcie spôsobené humánnymi papilomavírusmi (HPV)	I. dávka
			II. dávka

Poznámky:

* Pri použití vakcíny:

Rotarix: Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov. Vakcinačné schéma sa má prednostne podať pred dosiahnutím veku 16 týždňov, ale musí sa ukončiť do veku 24 týždňov.
Medzi dávkami má byť časový odstup najmenej 4 týždne.

Rotateq: Očkovacia schéma pozostáva z 3 dávok. Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov, a nie neskôr ako vo veku 12 týždňov. Troj-dávková očkovacia schéma sa uprednostňuje ukončiť do veku 20 až 22 týždňov. Ak je to nevyhnutné, môže sa tretia (posledná) dávka podať do veku 32 týždňov.

Medzi dávkami majú byť minimálne 4-týždňové intervaly.

**Odporúčané očkovanie proti VHA - v súlade s § 9 ods.4 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 585/5007 Z.z. sa očkujú deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania. deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.

***Odporúčané očkovanie hradené ZP proti infekciám, ktoré sú spôsobené humánnymi papilomavírusmi, sa aplikuje v 13. roku veku (12-ročným dievčatám a chlapcom).

**Doočkovanie ("catch-up") hradené zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2025,
ktoré je súčasťou Národného imunizačného programu**

ROČNÍK NARODENIA	VEK	DOOČKOVANIE ("CATCH-UP") HRADENÉ ZP	
		DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA
2012	<i>v 14. roku života*</i>	infekcie spôsobené humánnymi papilomavírusmi (HPV)	I. dávka
			II. dávka
2011	<i>v 15. roku života*</i>	infekcie spôsobené humánnymi papilomavírusmi (HPV)	I. dávka
			II. dávka
X	<i>Dospelí starší ako 30 rokov**</i>	záškrt, tetanus (dT)	I. dávka

Poznámky:

* Catch-up očkovanie proti infekciám, ktoré sú spôsobené humánnymi papilomavírusmi, sa môže aplikovať adolescentom v 14. a 15. roku veku (13-ročným a 14-ročným adolescentom), pokiaľ boli prekážkou očkovania v 13. roku veku dočasné kontraindikácie.

** Očkovanie dospelých, ktorí nedostali posilňovaciu (booster) dávku podľa očkovacieho kalendára.

Odporúčané očkovanie detí, ktoré nie je hrazené zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2025

ROČNÍK NARODENIA	ODPORÚČANÉ OČKOVANIE (NEHRADENÉ ZP)		
	VEK	DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA
X	<i>podľa zvoleného veku</i>	<i>tuberkulóza (TBC)</i>	I. dávka
X	<i>skupina B - od 2 mesiacov alebo 10 rokov - podľa druhu vaccíny (Bexsero od 2 mes., Trumenba od 10 r.) skupiny A, C, W a Y (Nimenrix od 6 týždňov)</i>	<i>meningokokové infekcie</i>	1 až 3 dávky a posilňovacia dávka podľa zvolenej vaccíny a podľa veku v čase podania prvej dávky*
X	<i>od 1 roka</i>	<i>kliešťová encefalitída</i>	I. dávka
			II. dávka
			III. dávka
			preočkovanie každé tri roky
2025 a staršie ročníky	<i>od 1 roka</i>	<i>ovčie kiahne (varicella)</i>	I. dávka
			II. dávka

Poznámky:

*V súlade s SPC k jednotlivým vaccínam proti meningokokovej meningitíde.