POVINNÉ pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, HRADENÉ zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2026, ktoré je súčasťou Národného imunizačného programu

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

<table>
<tr><th rowspan="2">ROČNÍK NARODENIA</th><th rowspan="2">VEK</th><th colspan="2">POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE HRADENÉ ZP</th></tr>
<tr><th>DRUH OČKOVANIA</th><th>TYP OČKOVANIA</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2026</td><td>v 3. mesiaci života (od prvého dňa 10. týždňa života*)</td><td rowspan="3">záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulárna vakcína),
vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové nákazy, detská obrna
(DTaP-VHB-Hib-IPV)
pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV),
simultánna aplikácia s hexavakcínou)**</td><td>I. dávka (základné očkovanie)</td></tr>
<tr><td>v 5. mesiaci života</td><td>II. dávka (základné očkovanie)</td></tr>
<tr><td>v 11. mesiaci života</td><td>III. dávka (základné očkovanie)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2025</td><td>najskôr prvý deň 15. mesiaca</td><td rowspan="2">osýpky, mumps, ružienka
(MMR)</td><td rowspan="2">I. dávka</td></tr>
<tr><td>najneskôr v 18. mesiaci života</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>v 5. roku života</td><td>osýpky, mumps, ružienka
(MMR)</td><td>II. dávka</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2021</td><td rowspan="2">v 6. roku života</td><td>záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna</td><td rowspan="2">preočkovanie</td></tr>
<tr><td>(DTaP-IPV)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2014</td><td rowspan="2">v 13. roku života</td><td>záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna</td><td rowspan="2">preočkovanie</td></tr>
<tr><td>(dTaP-IPV)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">Dospelí vo veku 30 rokov***</td><td>záškrt, tetanus</td><td>preočkovanie</td></tr>
<tr><td>(dT)</td><td>každých 15 rokov</td></tr>
</table>

Poznámky:

* Očkovanie hexavavalentnou vakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa.

** Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 15-valentná konjugovaná vakcína, 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína.

*** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

V prípade, ak sa nevykoná očkovanie podľa schémy uvedenej v očkovacom kalendári, postupuje sa v súlade s Prílohou č. 2a vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky

ODPORÚČANÉ očkovanie detí HRADENÉ zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2026, ktoré je súčasťou Národného imunizačného programu

ROČNÍK NARODENIA	VEK	ODPORÚČANÉ OČKOVANIE HRADENÉ ZP	
		DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA
2024	*v 3. roku života**	vírusová hepatitída A	I. dávka
			II. dávka
X	*od šiestich mesiacov do 12 rokov*	chrípka	jedna dávka každoročne
			u detí do 9 rokov, ktoré neboli v minulosti očkované, sa podáva aj II. dávka mesiac po I. dávke
2014	*v 13. roku života***	infekcie spôsobené humánnymi papilomavírusmi (HPV)	I. dávka
			II. dávka
2013	*v 14. roku života***	infekcie spôsobené humánnymi papilomavírusmi (HPV)	I. dávka
			II. dávka
2012	*v 15. roku života***	infekcie spôsobené humánnymi papilomavírusmi (HPV)	I. dávka
			II. dávka

Poznámky:

* Odporúčané okovanie proti VHA - v súlade s § 9 ods.4 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 585/5007 Z.z. sa očkujú deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.

** Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v 13. až 15. roku života u dievčat alebo chlapcov podľa § 9 a § 12 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. Ak lekár rozhodne o potrebe alebo vhodnosti očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi, prvá dávka vakcíny ako hradená liečba sa môže indikovať v 13. až 15. roku života u dievčat alebo chlapcov.

Odporúčané očkovanie detí NEHRADENÉ zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2026*

ROČNÍK NARODENIA	ODPORÚČANÉ OČKOVANIE (NEHRADENÉ ZP)		
	VEK	**DRUH OČKOVANIA**	**TYP OČKOVANIA**
X	podľa zvoleného veku	tuberkulóza (TBC)	I. dávka
2026	vo veku 6 - 24 týždňov (Rotarix) vo veku 6 - 32 týždňov (Rotateq)	rotavírusové infekcie	2 až 3 dávky podľa zvolenej vakcíny**
X	skupina B - od 2 mesiacov alebo 10 rokov - podľa druhu vakcíny (Bexsero od 2 mes., Trumenba od 10 r.)	meningokokové infekcie	1 až 3 dávky a posilňovacia dávka podľa zvolenej vakcíny a podľa veku v čase podania prvej dávky***
	skupiny A, C, W a Y (Nimenrix od 6 týždňov)		
X	od 1 roka	kliešťová encefalitída	I. dávka
			II. dávka
			III. dávka
			preočkovanie každé tri roky
2026 a staršie ročníky	od 1 roka	ovčie kiahne (varicella)	I. dávka
			II. dávka
X	podľa zvoleného veku	vírusová hepatitída A	I. dávka
			II. dávka

Poznámky:

* Odporúčané očkovanie môže byť čiastočne alebo plne hradené na základe rozhodnutia príslušnej ZP

** Rotarix: Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov. Vakcinačná schéma sa má prednostne podať pred dosiahnutím veku 16 týždňov, ale musí sa ukončiť do veku 24 týždňov. Medzi dávkami má byť časový odstup najmenej 4 týždne.

** Rotateq: Očkovacia schéma pozostáva z 3 dávok. Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov, a nie neskôr ako vo veku 12 týždňov. Troj-dávková očkovacia schéma sa uprednostňuje ukončiť do veku 20 až 22 týždňov. Ak je to nevyhnutné, môže sa tretia (posledná) dávka podať do veku 32 týždňov.
Medzi dávkami majú byť minimálne 4-týždňové intervaly.

*** V súlade s SPC k jednotlivým vakcínam proti meningokokovej meningitíde.